

Campagnol agreste

Microtus agrestis

Espèces ligneuses

Hêtre, érable, chêne, frêne, peuplier, merisier, douglas, sapin, mélèze, épicéa

Espèces ligneuses (en latin)

Fagus sylvatica, *Acer* sp., *Quercus* sp., *Fraxinus excelsior*, *Populus* sp., *Prunus avium*, *Pseudotsuga menziesii*, *Abies alba*, *Larix decidua*, *Picea abies*

Éléments de diagnostic

Ecorce détachée autour du pied de jeunes arbres jusqu'à 10 cm de haut ou plus si la couche de neige est élevée. Traces visibles de dents dans l'aubier. Double trace de dents d'une largeur de 2,5 mm.

Causes et conséquences

Lorsqu'il ne trouve pas suffisamment de nourriture, le campagnol agreste s'attaque principalement aux mûriers et aux framboisiers. Les arbres plantés sur des surfaces de coupe découvertes sont particulièrement exposés à ce danger.

Risques de confusion

Campagnol terrestre, campagnol des champs, campagnol roussâtre

Lutte

Eviter de procéder à des coupes rases. Former un écran protecteur avec des feuillus à bois tendre (tremble, sureau). Combiner la protection individuelle chimique et mécanique avec des mesures contre l'abrouissement des ongulés (protection chimique et mécanique contre les dégâts de frayure, gaine protectrice autour des arbres). Installer des pièges. Favoriser les ennemis naturels (renard, oiseaux de proie). Laisser les clôtures accessibles au renard.

Remarques



Campagnol agreste



Hêtre au pied rongé



Sapin rongé par le campagnol agreste